


# Comment agir ?

Venir en aide au courlis c'est :

- Conserver les prairies naturelles et les zones humides,
- Adopter une fauche tardive, centrifuge et à vitesse réduite,
- Conserver des bandes refuges pour la faune,
- Alerter lors de la découverte d'un site de nidification,
- Contribuer à la pose de protection autour des nids



En tant que consommateur, nous avons tous le pouvoir de favoriser un modèle agricole respectueux des paysages et de la biodiversité.

## Comment enrayer ce déclin ?

- Rencontrons-nous, paysans, habitants des villes et des campagnes, afin de reprendre en main notre alimentation dans le respect de l'environnement et des agriculteurs.
- Soutenons une agriculture de proximité en privilégiant la consommation via des circuits-courts.
- Soutenons une agriculture qui fait de la biodiversité un atout.

# Vous aussi, participez à la sauvegarde de cet oiseau emblématique !

Prenez contact avec le responsable de  
votre secteur :

Puy de Dôme

Clément Rollant – 07.76.03.04.91

Cantal

Mathis Vérité – 06.42.30.51.72



## Communiquez-nous vos observations de Courlis cendré !

La protection de ces espèces, et surtout de leur habitat, passe aussi par une amélioration des connaissances, ce à quoi tout le monde peut contribuer.

Si vous voyez un courlis cendré, n'hésitez pas à nous l'indiquer en renseignant l'information sur [faune-auvergne.org](http://faune-auvergne.org) ou sur l'application mobile Naturalist ou sur les portails locaux.

Cette action est cofinancée par l'Union européenne dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).



Crédits photos : © Romain Riols,  
© Mathis Vérité

Dessin : © Romain Riols

Ne pas jeter sur la voie publique

# Le Courlis cendré, oiseau emblématique de nos prairies



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

## FICHE D'IDENTITÉ



Nom : Courlis cendré  
Numenius arquata


Famille : Limicole  
(petits échassiers des zones humides)

Taille : 60 cm de long,  
envergure 80 à 100 cm

Poids : 475 à 1360 g

Signes distinctifs : long bec incurvé vers le bas, haut sur pattes.

Statut de conservation : Vulnérable en France\* et En danger en Auvergne\*\*. La population auvergnate est aujourd'hui **réduite à moins de 100 couples** et ne cesse de décliner (-20% dans le Puy de Dôme depuis 2000).




## Alimentation

Dans les prairies où il se reproduit, le Courlis se nourrit d'insectes, larves, chenilles, lombrics, petits escargots, araignées... Tandis que sur les lieux d'hivernage, il consomme mollusque et crustacés qu'il prélève dans la vase.

## Habitat

Le Courlis cendré fréquente différents milieux ouverts plus ou moins humides : tourbières, landes tourbeuses, vallées alluviales, etc... En Auvergne, on le trouve principalement dans les prairies humides, les marais et les narses des plateaux d'altitudes (Planèze de Saint-Flour) ainsi que dans certaines zones de grandes cultures en plaine comme la Limagne et le Val d'Allier. Nicheur au sol, le courlis a besoin de parcelles tranquilles et riches en proies pour mener à bien sa reproduction.

Suite à la régression de ses milieux de reproduction naturels, il a progressivement colonisé les espaces cultivés où il niche à même le sol.



□ Limites départementales  
Répartition du Courlis cendré  
■ Actuelle  
▨ Historique

## Des oiseaux menacés

### La perte de son habitat

Les zones humides et les prairies naturelles sont des milieux sur lesquels pèsent de nombreuses menaces : artificialisation des sols, drainage, mise en culture, etc... L'érosion dramatique de ces habitats au cours des derniers siècles conduit à un morcellement de plus en plus important des zones favorables au courlis.



Narse de Nouvialle

### L'évolution des pratiques agricoles

L'évolution du modèle agricole (méthodes culturales plus intensives : enrubannage, ensilage...), couplé au changement climatique, induisent des dates de fauches de plus en plus précoces mettant en péril la nidification des courlis (œufs écrasés, juvéniles fauchés, etc...). Une fertilisation importante des prairies entraîne également une modification de la structure de la végétation avec des graminées plus hautes et plus denses dans les lesquels les poussins se déplacent difficilement. Ces prairies à plus faible diversité floristique présentent également une ressource alimentaire appauvrie.



### La prédation

Malgré un plumage cryptique difficile à repérer dans l'herbe et un fort comportement territorial, le Courlis cendré est particulièrement vulnérable aux prédateurs en période de nidification.



\* UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France.

\*\*R. Riols & P. Tourret, 2016. Liste rouge des oiseaux d'Auvergne. LPO Auvergne, DREAL Auvergne.